

اثرات اورتان و نیتریت سدیم بر بافت‌های مختلف موش

دکتر فربیا کوهدانی: استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ایران
نویسنده رابط: fkoohdan@sina.tums.ac.ir

دکتر فرهنگ ساسانی: دانشیار، گروه پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ایران

دکتر کاظم محمد: استاد، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت و انسیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ایران

دکتر پروین مهدی پور: استاد، گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ایران

دریافت: ۱۶۸۶/۷/۳ پذیرش: ۱۳۸۶/۹/۶

چکیده

زمینه و هدف: برای تعیین حساسترین بافت‌ها نسبت به اثرات سرطان‌زایی اورتان و تاثیر مصرف نیتریت سدیم بر آن بررسی هیستوپاتولوژیکی بر روی نوزده بافت موش انجام شد.

روش کار: مطالعه حاضر از نوع تجربی (Experimental) بر روی ۴۰ موش بالبی ۱۱-۹ هفت‌هه که به طور تصادفی به ۴ گروه مساوی تقسیم شدند (۵ موش نر و ۵ موش ماده) انجام شد. آنها را برای مدت ۲۰ هفت‌هه تحت مداخله قرار دادیم. گروه اول (NS+NaCl) در طی مداخله به جای آب آشامیدنی از سرم فیزیولوژی که 50 mg/L نیتریت سدیم در آن حل شده بود استفاده نمودند. گروه دوم (U) به مدت سه روز پشت سر هم و هر روز یک بار اورتان (100 mg/kg) در داخل صفاق (IP) تزریق شد. گروه سوم (U+NS) نیز با همین روش اورتان دریافت نمودند و علاوه بر آن، در طی مداخله همراه آب آشامیدنی (50 mg/L) نیتریت سدیم داده شد. در گروه چهارم (U) هیچ‌گونه مداخله‌ای انجام نشد. کلیه موشهای باقیمانده در هفت‌هه ۲۰ کشته و مورد بررسی قرار گرفت. بافت‌های مغز، جشم، قلب، ریه، معده، مری، دودنوم، ژوژنوم، کولون، سکوم، پانکراس، طحال، کبد، کلیه، مثانه، تخمدان، رحم، لوله‌های رحمی، بیضه، آنها جهت تغییرات هیستوپاتولوژیک مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج با استفاده از تست فیشر دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: در کل موشهای مورد بررسی در گروه "U" نسبت به گروه‌های "C" و "NS+NaCl" به ترتیب $p < 0.004$ و $p < 0.02$ ، و در گروه "U+NS" نسبت به گروه‌های "C" و "NS+NaCl" به ترتیب $p < 0.003$ و $p < 0.02$ تشکیل تومورهای ریوی افزایش معنی داری داشت. در موشهای ماده مورد بررسی، تومورهای ایجاد شده در بافت ریه در گروه "U" نسبت به هر دو گروه "C" و "NS+NaCl" ($p < 0.05$) و همچنین در گروه "U+NS" نسبت به گروه‌های "C" و "NS+NaCl" ($p < 0.009$) بیشتر بود. در کل موشهای تحت بررسی فراوانی تومورهای بدخیم، در گروه "U+NS" نسبت به هر دو گروه "C" و "NS+NaCl" ($p < 0.03$) افزایش معنی دار داشت. در موشهای ماده مورد بررسی علاوه بر اینکه فراوانی تومورهای بدخیم در گروه "U+NS" نسبت به دو گروه "C" و "NS+NaCl" ($p < 0.009$) بیشتر بود نسبت به گروه "U" نیز ($p < 0.05$) افزایش معنی دار داشت. اختلاف بین فراوانی هیپرپلازی و متاپلازی در بافت معده گروه‌های مورد بررسی معنی دار نبود. در سایر بافت‌ها ضایعه غیر طبیعی مشاهده نشد.

نتیجه گیری: ۱ اورتان در بافت ریه اثرات تومور زایی داشت. ۲- مصرف توان نیتریت سدیم با اورتان باعث تقویت اثرات تومور زایی اورتان در موشهای ماده و همچنین ایجاد تومورهای بدخیم هم در موشهای ماده و هم در کل موشاها نسبت به گروه‌های "کنترل" و "نیتریت و کلرید سدیم" شد. به طوری که در موشهای ماده این گروه علاوه بر گروه‌های "کنترل" و "نیتریت و کلرید سدیم" نسبت به گروه "اورتان" نیز تشکیل تومورهای بدخیم تفاوت آماری معنی دار داشت. تقویت اثرات بدخیمی اورتان بوسیله نیتریت سدیم برای اولین بار در این مقاله گزارش شده است.

واژگان کلیدی: نیتریت سدیم، اورتان، سرطان، موش

مقدمه

روی ۴۰ موش بالبی ۹-۱۱ هفته که به طور تصادفی به ۴ گروه مساوی تقسیم شدند (۵ موش نر و ۵ موش ماده) انجام شد. موشهای هر گروه بر اساس جنسیت در قفسهای مجرزا، نگهداری شدند. موشهای ماده ۱۵-۲۰ گرم و موشهای نر ۱۵-۲۰ گرم وزن داشتند. در طی انجام مطالعه رطوبت، دما و نور محیطی تحت کنترل بود. همه موشهای از بسته‌های غذایی آماده معمول به مقدار دلخواه تغذیه می‌شدند و ۱۰-۱۵ روز یکبار به آنها هویج تازه داده می‌شد. هیچ نوع آنتی‌بیوتیک، ویتامین یا داروی دیگری در طی مطالعه در هیچ یک از گروه‌ها استفاده نشد.

اورتان (Urethane) با فرمول شیمیایی $C_3H_7NO_2$ وزن مولکولی ۸۹/۰۹ و شماره کد LOT:125 H03/8 از شرکت سیگما تهیه شد. نیتریت سدیم (Sodium Nitrite) با فرمول شیمیایی $NaNO_2$ وزن مولکولی ۶۹ gr/mol و شماره کد ۱۰۶۵۴۹/۰۵۰۰ از شرکت مرک (Merck) آلمان تهیه شد. کلرید سدیم به صورت سرم فیزیولوژی ۰/۹٪ از داروخانه تهیه می‌شد.

موشهای مورد مطالعه را برای مدت ۲۰ هفته تحت مداخله قراردادیم.

گروه اول (NS+NaCl): در این گروه از زمان شروع مطالعه به مدت ۲۰ هفته به جای آب آشامیدنی از سرم فیزیولوژی L/mg ۵۰ که نیتریت سدیم در آن حل شده بود استفاده شد.

گروه دوم (U): به این گروه در طی ۴۸ ساعت با فواصل مساوی، ۳ بار اورتان و در هر بار mg/kg ۶۰۰، در داخل صفاق [IP] [Intra peritoneal] تزریق شد.

گروه سوم (U+NS): مشابه گروه سوم به آنها اورتان تزریق شد. به این گروه همزمان با اولین تزریق اورتان تا پایان دوره ۲۰ هفته‌ای مداخله L/mg ۵۰ نیتریت سدیم همراه با آب آشامیدنی داده شد.

گروه چهارم (C): موشهای این گروه تحت هیچ گونه مداخله‌ای قرار نگرفتند.

از زمان شروع مطالعه تا هفته بیستم هر گاه موشی تلف شد سعی بر این بود که بلافارسله نمونه‌های بافتی آن تهیه

اورتان در رژیم غذایی روزمره، مصارف فراوانی دارد (Dennis et al. 1997; Schlatter et al. 1990). این ماده از تخمیر میکروبی مواد غذایی خصوصاً مشربوبات الكلی به وجود می‌آید و یک ماده شناخته شده سرطانزا در حیوانات و احتمالاً در انسان است (Hoffler et al. 2003; Chan 1996; Azevedo et al. 2002 ; Mirvish 1968 et al. 2003; Chan 1996; Azevedo et al. 2002). این ماده توسط آزانس بین‌المللی تحقیقات سرطان به عنوان یک ماده سرطانزا احتمالی در انسان مطرح شده است (Chan 1996). نان محتوی ۳-۱۵ ng/g، کنیاکهای حاصل از میوه‌های هسته‌دار ۲۰۰۰-۲۰۰۰۰ ng/g و حدود یک سوم از نمونه‌های شرابهای معمولی محتوی بیش از ۱۰ ng/g اورتان هستند (Schlatter et al. 1990). همچنین از بین مواد موجود در رژیم غذایی نقش احتمالی نیتراتها و Luca et al. (1987) نیتریتها در سرطانزا گزارش شده است. در باره مصرف توأم مواد مذکور مطالعه Ilnitskii و همکارانش نشان می‌دهد که مصرف طولانی نیتریت سدیم اثرات تومورزا اورتان را تقویت می‌نماید (Ilnitskii et al. 2000). از آنجائی که در این مطالعه فقط به نقش اورتان در ایجاد تومور (اعم از خوش خیم و بدخیم) اشاره شده است تحقیق حاضر بر آن است تا نقش اورتان را در ایجاد تومورهای بدخیم نیز بررسی نماید. از سوی دیگر در بررسی قبلی نقش کمک سرطانزا نیتریت در مراحل تشکیل و پیشرفت تومور در بافت ریه موشهای تحت مداخله با اورتان، دیده شد (کوهدانی ۱۳۸۴).

بنابراین هدف از انجام این بررسی تعیین حساسترین بافتها نسبت به اثرات سرطانزا اورتان و نیتریت سدیم از طریق بررسی هیستوپاتولوژیکی بر روی نوزده بافت مختلف موش بود.

روش کار
مطالعه حاضر از نوع تجربی (Experimental) بر

طبقه‌بندی شدند. اطلاعات مربوط به شیوع ضایعات ریوی در هر یک از گروه‌ها نسبت به یکدیگر با استفاده از آزمون آماری فیشر تعیین شد.

نتایج

در گروه «U»: در بافت ریه هم آدنوم و هم کارسینوم دیده شد. تشکیل تومورهای ریوی در کل مشاهدهای این گروه (جدول ۱) نسبت به گروههای «C» ($p < 0.004$) و «NS+NaCl» ($p < 0.02$) و همچنین در مشاهدهای ماده (جدول ۱) نیز نسبت به هر دو گروه «C» و «NS+NaCl» ($p < 0.05$) افزایش آماری معنی‌دار داشت. تشکیل تومورهای بدخیم در ریه با سایر گروه‌ها اختلاف آماری معنی‌داری نداشت (جدول ۲). در بافت معده یک مورد هیپرپلازی و ۲ مورد متاپلازی مشاهده شد. در سایر بافت‌ها هیچگونه تغییر پاتولوژیکی مشاهده نشد.

در گروه «U+NS»: تشکیل تومورهای ریوی در کل مشاهدهای این گروه (جدول ۱) نسبت به گروههای «C» ($p < 0.003$) و «NS+NaCl» ($p < 0.02$) و در مشاهدهای ماده (جدول ۱) نسبت به گروههای «C» و «NS+NaCl» ($p < 0.009$) بیشتر بود. در بافت ریه در بین کل حیوانات (مجموع حیوانات نر و ماده) و حیوانات ماده این گروه بیشترین تعداد کارسینوم، دیده شد (جدول ۲). تشکیل تومورهای بدخیم ریوی نیز در این گروه در کل مشاهدهای ($p < 0.003$) (جدول ۲) و در مشاهدهای ماده ($p < 0.009$) (جدول ۲) نسبت به هر دو گروه «C» و «NS+NaCl» افزایش معنی‌داری داشت. همچنین در مشاهدهای ماده تشکیل تومورهای بدخیم نسبت به گروه «U» نیز افزایش آماری معنی‌دار نشان داد ($p < 0.05$) (جدول ۲). در بافت معده ۳ مورد هیپرپلازی و یک مورد متاپلازی مشاهده شد. در سایر بافت‌ها هیچگونه تغییر پاتولوژیکی مشاهده نشد (جدول ۳).

بحث

سرطان ریه نه تنها در امریکا بلکه در سرتاسر جهان در

شود. مشاهدهای باقیمانده در پایان هفته ۲۰ ابتدا توسط ml ۵/۱۰٪ محلول ۱٪ اورتان در سرم فیزیولوژی به حالت بیهوشی عمیق رفته سپس انها را کشته و بافت‌های مورد نظر خارج شد. هر بافت جهت بررسی هیستوپاتولوژیک در ظرف محتوی فرمالین ۱۰٪ قرار داده شد. بافت ارسالی به صورتی برش خورد که در صورت مشاهده ضایعه در آن قسمتی از بخش سالم در کنار ضایعه موجود باشد. در آزمایشگاه آسیب شناسی ابتدا هر نمونه مورد بررسی مجدد قرار می‌گرفت و از آنها قطعاتی به ابعاد ۱۰-۱۵ میلی‌متر جدا و برای ادامه مراحل هیستولوژی در ظرف جداگانه‌ای با شماره‌گذاری یکسان قرار داده می‌شوند. مرحله آب‌گیری از بافت‌های انتخاب شده همزمان و بر روی تمام نمونه‌ها به صورت استاندارد انجام شد. مرحله غوطه‌ورسازی در پارافین نیز در مدت زمانی حدود ۱۲ ساعت صورت گرفت. آن گاه عمل قالب‌گیری با پارافین مذاب انجام و نمونه‌ها برای برش آماده شوند. برشهای هیستولوژیک به کمک دستگاه میکروتوم مدل LICA با ضخامت ۵ میکرون تهیه شد.

سپس فیلمهای پارافین حاوی برشهای بافت پس از انتقال به حمام گرم بر روی لامهایی که از قبل تمیز و آغشته به چسب آلبومین بود منتقل شد، بعد از ثبوت سطحی تمام لامها پس از پارافین زدایی در محلول گزیل، با روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شوند (بهادری ۱۳۶۹).

مطالعه میکروسکوپی تمام اسلامیدها ابتدا با بزرگنمایی حداقل و سپس برای رسیدن به تشخیص و تفسیر قطعی با بزرگنمایی ۱۰۰ ادامه یافت. لازم به ذکر است که پاتولوژیست و فرد آنالیز کننده آماری از تخصیص مشاهدها در گروه‌های مورد نظر مطلع نبودند. به هنگام مطالعه میکروسکوپیک، از میدانهای دارای اهمیت تشخیصی عکسهایی تهیه شد. واکنشهای بافتی یکسان و طبیعی در کنار پدیده‌های پاتولوژیک خاص در مورد تمام نمونه‌ها مورد توجه قرار گرفت و ضایعات ریوی در سه گروه هیپرپلازی، آدنوم و کارسینوم آلوئول / برونشیول

گروه کنترل و تومورهای بدخیم نسبت به گروه کنترل $p < 0.005$ و گروه "اورتان" ($p < 0.005$) تفاوت معنی دار داشت. مقایسه نتایج فوق نشان می دهد وقتی نیتریت سدیم همراه با اورتان داده شود باعث بروز معنی دار اثرات بدخیمی ناشی از اورتان در کل موشهای ماده می شود و در موشهای ماده تومورزاوی ناشی از اورتان را نیز تقویت می نماید.

از طرف دیگر وقتی اثرات تومورزاوی و تشکیل تومورهای بدخیم در گروه «اورتان و نیتریت» با گروه «نیتریت و کلرید سدیم» مقایسه شد به ترتیب با $p < 0.002$ و $p < 0.003$ و در موشهای ماده ($p < 0.009$) و ($p < 0.009$)، تفاوت معنی دار بود. بنابراین ظاهرابه نظر می رسد تاثیرات نیتریت سدیم در موشهای ماده قویتر است. از سوی دیگر می توان نتیجه گرفت که نیتریت سدیم فقط در شرایطی که همراه با اورتان مصرف شده است، اثرات تومورزاوی و تشکیل تومور بدخیم در ریه داشته است و مصرف این ماده همراه با کلرید سدیم چنین نقشی را ایفا نکرده است.

نه تنها نیتریت سدیم اثرات ناشی از اورتان خصوصاً اثرات بدخیمی و تشکیل آدنوکارسینوم را به میزان معنی داری افزایش می دهد، بلکه اورتان نیز متقابلاً باعث تقویت اثرات هم سرطانزاوی (Co-carcinogenic) نیتریت سدیم می شود (Synergism). لازم به ذکر است نتایج مطالعه حاضر برای اولین بار نقش نیتریت سدیم را در تقویت معنی دار اثرات بدخیمی اورتان در ریه نشان می دهد. به منظور بررسی مکانیسم عمل مواد مذکور، بافتی موشهای توموری از نظر وجود جهش در اگرزوں یک ژن k-ras و پرولیفرازیون سلولی توسط پروتئین 67 k مورد بررسی قرار گرفتند که در مقالات بعدی نتایج گزارش می شود.

نتایج دو مطالعه نشان داد سطح سرمی نیتریت و نیترات در بیماران مبتلا به سرطان ریه به میزان معنی داری بیش از Colakogullari 2006; Esme 2008 گروه کنترل بود (Colakogullari در سال 2006 دیده همچنین در مطالعه شد افزایش سطح سرمی نیتریت و نیترات شانسبقاء را در

راس عواملی است که منجر به مرگ و میر ناشی از سرطان می شود (Molina 2008).

تومورزاوی اورتان در بافت ریه توسط سایر مطالعات تأیید شده است (Dong et al. 1998; Koujitan et al. 2001; Kawano et al. 1995; Chan 1996; Balansky et al. 1998; Iminitov 1999; Mori et al. 2000) در مطالعه ما نیز تشکیل تومور در بافت ریه در کل موشهای موشهای ماده گروه اورتان نسبت به گروههای C [به ترتیب ($p < 0.004$) و NS+NaCl ($p < 0.005$) و به ترتیب ($p < 0.02$) و ($p < 0.05$)] تفاوت معنی دار داشت. اما تشکیل تومور بدخیم بافت ریه در این گروه نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشت.

مدلی که در مطالعه ما استفاده شد در ضایعات ریوی ناشی از اورتان، مرحله هیپرپلازی احتمالاً حذف شده است در حالی که بروز آدنوم و کارسینوم افزایش یافت. یافته های ما با مطالعه ای که بر روی موش CBA/J انجام شد همخوانی دارد و نتایج این مطالعه را در مورد حذف Cazorla et al. (1998) مرحله هیپرپلازی در ریه، تأیید می کند.

یافته های این بررسی نتایج مطالعه Yu را تأیید نکرد (Yu et al. 1999). مطالعه ما بر روی موشهای بالغ و طی یک دوره مداخله ۲۰ هفته ای انجام شد. احتمالاً زمان مواجهه با اورتان و فاصله زمانی بین بررسی و زمان مواجهه، عامل این تفاوت یافته ها است. به نظر میرسد مواجهه با اورتان در مراحلی که تقسیمات سلولی سریعتر است خطرات تومورزاوی بیشتری در معده داشته باشد. از سوی دیگر انجام مطالعات بعدی در دوره زمانی طولانی تر ممکن است اثرات این ماده را در معده بهتر نشان دهد.

در حالی که در گروه «اورتان و نیتریت» در کل موشهایم تشکیل تومورهای ریوی ($p < 0.003$) و هم تشکیل تومورهای بدخیم یا آدنوکارسینوم ($p < 0.003$) (جدول ۴) نسبت به گروه کنترل معنی دار بود در موشهای ماده نیز تشکیل تومورهای ریوی ($p < 0.009$) نسبت به

تسهیلاتی در تحقیقات سرطان معده، در اولویت قرار دارد. متاپلازی روده‌ای به عنوان یک وضعیت پیش سرطانی مورد توجه است (Tatematsu et al. 1989).

نتیجه گیری

۱- اورتان در بافت ریه اثرات تومور زایی داشت. ۲- مصرف توام نیتریت سدیم با اورتان باعث تقویت اثرات تومور زایی اورتان در موشهای ماده و همچنین ایجاد تومورهای بدخیم هم در موشهای ماده و هم در کل موشهای شد. تقویت اثرات بدخیمی اورتان بوسیله نیتریت سدیم برای اولین بار در این مقاله گزارش شده است. مصرف روزانه نیتریت چه به صورت یک افزودنی غذایی و چه در آب آشامیدنی حتی در مقادیری که مصرف این ماده به تنها بی تاثیر نا مطلوبی ایجاد نمی کند ممکن است منجر به تشدید اثرات سوء اورتان شود و مصرف توام اورتان با نیتریت باعث افزایش معنی دار در ایجاد تومورهای بد خیم و در نتیجه تشدید اثرات سرطانزایی اورتان شد.

پیشنهادات: با توجه به یافته های این بررسی، برای تأیید نقش نیتریت سدیم در افزایش اثرات تومورزایی اورتان در بافت ریه- به ویژه در تشکیل تومورهای بدخیم- انجام تحقیقات بعدی پیشنهاد می شود.

همچنین توصیه می شود در مطالعات آینده نقش جنسیت به عنوان یک متغیر مخدوش کننده احتمالی در بروز اثرات کمک سرطان زایی نیتریت سدیم، کنترل شود.

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان مراتب تشکر و قدر دانی خود را از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران که بودجه لازم جهت اجرای این پژوهش را فراهم ساختند (طرح شماره ۱۱۸۷/۱۳۲) ابراز می دارند.

بیماران به میزان معنی داری کاهش می دهد.

در مطالعه IIinitskii و همکارانش مصرف طولانی مدت نیتریت سدیم در بروز تعداد آدنوم ریه ناشی از مصرف اورتان افزایش معنی داری ایجاد کرده است. نتایج مطالعه ما در موشهای ماده این گروه، یافته‌های این مطالعه را درباره تقویت اثرات تومورزایی اورتان توسط نیتریت سدیم تأیید می کند. مطالعه دیگری در زمینه مصرف توأم این دو ماده انجام نشده است.

هیپرپلازی در بافت معده گروه «اورتان و نیتریت» نسبت به گروه کنترل به نظر بیشتر می رسید اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود ($p < 0.08$) (جدول ۳). در یک مطالعه بر روی F344 Rats نر در حالیکه کاتکل یا ۳- متوكسی کاتکل به تنها بی تاثیر باعث هیپرپلازی خفیف یا متوسط معده شد لیکن مصرف همزمان آنها با نیتریت سدیم درجه هیپرپلازی و تشکیل پاپیلوم را افزایش داد. بنابراین نتایج این مطالعه نشان می دهد که نیتریت سدیم احتمالاً از طریق ایجاد میتوزهای فعال جدید اپی تلیوم پیش معده را افزایش می دهد (Hirose et al. 1990). نتایج ما با داده های این مطالعه همخوانی دارد.

اغلب تومورهای پیش معده از مسیر اکانتوزیز (Hyperkeratosis) یا هیپرکراتوزیس (Acanthosis)، لوکوکراتوزیس (Leukokeratosis) و پاپیلوم (Papilloma) عبور کرده و نهایتاً به شکل کارسینومای Squamous cell (Squamous cell carcinoma) تهاجم می باند (Maekawa et al. 1976). در مطالعه ما نیز در گروههای مختلف ۴ مورد متاپلازی که همگی همراه با هیپرکراتوزیس بودند یافت شد.

لازم به ذکر است که ۲ مورد آنها در گروه «اورتان و نیتریت» یک مورد در گروه اورتان و یک مورد در گروه «نیتریت و کلرید سدیم» بود.

با توجه به سیر بسیار طولانی مراحل شروع سرطان معده، تعیین جراحات بیش سرطانی این بافت برای ایجاد

جدول ۱- شیوع تومورهای ریوی در موشهای تحت مطالعه

Pvalue	تومور تعداد(درصد)	طبیعی تعداد(درصد)	تعداد حیوانات آزمایش شده	گروه موش
(۰)۰	(۱۰۰)۴	(۱۰۰)۴	۴/۰۰	کنترل (C)
(۲۵)۱	(۷۵)۳	(۷۵)۳	۴/۰۰	نیتریت و کلرید سدیم (NaCl + NS) نر
(۶۰)۳	(۴۰)۲	(۴۰)۲	۵/۰۰	اورتان (U)
(۵۰)۲	(۵۰)۲	(۵۰)۲	۴/۰۰	اورتان و نیتریت سدیم (U + NS)
(۰)۰	(۱۰۰)۵	(۱۰۰)۵	۵/۰۰	کنترل (C)
(۰)۰	(۱۰۰)۵	(۱۰۰)۵	۵/۰۰	نیتریت و کلرید سدیم (NaCl + NS) ماده
۰/۰۵	(۸۰)۴*	(۸۰)۴*	۵/۰۰	اورتان (U)
۰/۰۰۹	(۱۰۰)۵**	(۱۰۰)۵**	۵/۰۰	اورتان و نیتریت سدیم (U + NS)
(۰)۰	(۱۰۰)۹	(۱۰۰)۹	۹/۰۰	کنترل (C)
(۱۱/۱)۱	(۸۸/۹)۸	(۸۸/۹)۸	۹/۰۰	نیتریت و کلرید سدیم (NaCl + NS) کل
۰/۰۰۴	(۷۰)۷****,***	(۷۰)۷****,***	۱۰/۰۰	اورتان (U)
۰/۰۰۴	(۷۷/۸)۷****,***	(۷۷/۸)۷****,***	۹/۰۰	اورتان و نیتریت سدیم (U + NS)

* تفاوت آماری معنی دار با گروه های "کلرید سدیم و نیتریت" و "کنترل" ($p < 0.05$)

** تفاوت آماری معنی دار با گروه های "نیتریت و کلرید سدیم" و "کنترل" ($p < 0.009$)

*** تفاوت آماری معنی دار با گروه "کنترل" (۴) ($p < 0.004$)

**** تفاوت آماری معنی دار با گروه "نیتریت و کلرید سدیم" (۲) ($p < 0.02$)

جدول ۲- شیوع تومور بدخیم ریه در موشهای تحت مطالعه

Pvalue	بدخیم تعداد(درصد)	خوش خیم تعداد(درصد)	تعداد حیوانات آزمایش شده	گروه موش
(۰.)۰	(۴)۱۰۰	(۴)۱۰۰	۴/۰۰	کنترل (C)
(۲۵)۱	(۷۵)۳	(۴)۰۰	۶/۰۰	نیتریت و کلرید سدیم (NaCl + NS)
(۶۰)۳	(۴۰)۲	۵/۰۰		اورتان (U)
(۵۰)۲	(۵۰)۲	۴/۰۰		اورتان و نیتریت سدیم (U + NS)
(۰.)۰	(۱۰۰)۵	۵/۰۰		کنترل (C)
(۰.)۰	(۱۰۰)۵	۵/۰۰		نیتریت و کلرید سدیم (NaCl + NS)
(۲۰)۱	(۸۰)۴	۵/۰۰		اورتان (U)
۰/۰۵ و ۰/۰۰۹	(۱۰۰)۵*	(۰.)۰	۵/۰۰	اورتان و نیتریت سدیم (U + NS)
(۰.)۰	(۱۰۰)۹	۰۰۹		کنترل (C)
(۰.)۰	(۱۰۰)۹	۹/۰۰		نیتریت و کلرید سدیم (NaCl + NS)
(۴۰)۴	(۶۰)۶	۱۰/۰۰		اورتان (U)
۰/۰۰۳	(۷۷/۸)۷**	(۲۲/۲)۲	۹/۰۰	اورتان و نیتریت سدیم (U + NS)

* تفاوت آماری معنی دار با گروه های "نیتریت و کلرید سدیم" و "کنترل" ($p < 0.009$) و "اورتان" ($p < 0.05$)

** تفاوت آماری معنی دار با گروه های "کلرید سدیم و نیتریت" و "کنترل" ($p < 0.003$)

جدول ۳- شیوع هیپرپلازی در بافت‌های موشهای تحت مطالعه

جمع	هیپرپلازی	طبیعی	گروه
	تعداد(درصد)	تعداد(درصد)	
۸/۰۰	(۰)۰	(۱۰۰)۸	کنترل (c)
۸/۰۰	(۲۵)۲	(۲۵)۶	نیتریت و کلرید سدیم (NaCl + NS)
۹/۰۰	(۱۱/۱)۱	(۸۸/۹)۸	اورتان (U)
۸/۰۰	(۴۲/۹)۳*	(۵۷/۱)۴	اورتان و نیتریت سدیم (U + NS)

* تفاوت آماری با گروه کنترل ($p < 0.08$) معنی دار نبود.

منابع

- بهادری، م. ۱۳۶۹. فن بافت شناسی و روش‌های رنگ‌آمیزی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
- کوهدانی، ف. ۱۳۸۴. بررسی اثرات سرطانزایی نیتریت و کلرید سدیم و اثرات ضد سرطانی ویتامین D توسط آزمایشات هیستوپاتولوژیک و رדיابی جهش‌های انتخابی اگزون ۱ ژن k-ras در برخی از بافت‌های موش بالبسبی. پایاننامه دکترای علوم تغذیه، تبریز: دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
- Abraham, S.C., Park, S.J., Lee, J.H., Mugartegui, L. & Wu, T.T., 2003. Genetic alteration in gastric adenomas of intestinal and foveolar phenotypes. *Mod Pathol*, **16**, pp. 786-95.
- Azevedo, Z., Couto, J.A. and Hogg, T., 2002. Citrulline as the main precursor of ethyl carbamate in model fortified wines inoculated with *Lactobacillus hilgardii*: a marker of the levels in a spoiled fortified wine. *Letters in Applied Microbiology*, **34**, pp. 32-36.
- Balansky, R.M. and De Flora, S., 1998. Chemoprevention by N-acetylcysteine of urethane-induced clastogenicity and lung tumors in mice. *Int J Cancer*, **77**, pp. 302-5.
- Cazorla, M., Hernández, L., Fernández, P.L., Fabra, A., Peinado, M.A., Dasenbrock, C., Tillmann, T., Kamino, K., Campo, E., Kohler, M., Morawietz, G., Cardesa, A., Tomatis, L. and Mohr, U., 1998. K-ras gene mutations and absence of p53 gene mutations in spontaneous and urethane-induced early lung lesions in CBA/J mice. *Molecular carcinogenesis*, **21**, pp. 251-260.
- Chan, P.C., 1996. NTP technical report on toxicity studies of urethane in drinking water and urethane in 5% ethanol administered to F344/N rats and B6C3F1 mice. *Toxic Rep Ser*, **52,1-91,A1-9,B1-9**passim.
- Colakogullari, M., Ulukaya, E., Yilmaztep, A., Ocakoglu, G., Yilmaz, M., Kardag, M. and Tokullugil, A., 2006. Higher serum nitrite levels are associated with poor survival in lung cancer. *Clinical Biochemistry*, **39**, pp. 898-03.
- Correa, P., Haenszel, W., Cuello, C., Tannenbaum, S. and Archer, M., 1975. A model for gastric cancer epidemiology. *Lancet*, **2**, pp. 58-60.
- Dennis, M.J., Massey, R.C., Ginn, R., Willettes, P., Crews, C. and Parker, I., 1997. The contribution of azodicarbonamide to ethyl carbamate formation in bread and beer. *Food addit Contam*, **14**, pp. 101-8.
- Dong, Q., Li, S., Xiao, B., Zhang, X. and Liu, X., 1998. A comparison study on the sensitivity of lung tumor shortterm induction test in three strains of mice. *Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao*, **29**, pp. 252-5.
- Esme, H., Cemec, M., Sezer, M., Saglam, H., Demir, A., Melek, H. and Unlu, M., 2008. High level of oxidative stress in patients with advanced lung cancer. *Respiro*, **13**, pp. 112-116.

- nitrosourethan in the drinking water. *Gann*, **67**, pp. 549-59.
- Mirvish, S.S., 1968. The carcinogenic action and metabolism of urethane and N-hydroxyurethane, *Adv. Cancer Res*, **11**, pp.1-42.
- Molina, J.R., Yang, P., Cassivi, S.D., Schild, S.E. and Adjei, A.A., 2008. Non-small cell lung cancer: epidemiology, risk factors, treatment, and survivorship. *Mayo Clin Proc.*, **83**, pp. 584-94.
- Mori, I., Yasuhara, K., Hayashi, S.H., Nonoyama, T. and Nomura Tand Mitsumori. K., 2000. Carcinogen dose-dependent variation in the transgene mutation spectrum in urethane -induced lung tumors in transgenic mice carrying the human prototype c-Ha-ras gene. *Cancer Letters*, **153**, pp.199-209.
- Schlatter, J. and Lutz, W.K., 1990. The carcinogenic potential of ethyl carbamate (urethane): risk assessment at human dietary exposure levels. *Food Chem Toxicol*, **28**, pp. 205-11.
- Tatematsu, M., Ozaki, K., Mutai, M., Shichino, Y., Furihata, C. and Ito, N., 1989. Enhancing effects of various gastric carcinogens on development of pepsinogen-altered pyloric glands in rats. *Carcinogenesis*, **11**, pp.1975-1978.
- Yu, W., Sipowicz, M.A., Haines, D.C., Birely, L., Diwan, B.A., Riggs, C.W., Kasprzak, K.S. and Anderson, L.M., 1999. Preconception urethane or chromium (III) treatment of male mice: multiple neoplastic and non neoplastic changes in offspring. *Toxicol Appl Pharmacol.*, **158**, pp. 161-176.
- fmodifying effects of eugenol on development of lung proliferative lesions induced by urethane in transgenic mice carrying the human prototype c-Ha-ras gene. *J Toxicol Sci*, **26**, pp. 129-39.
- Hirose, M., Fukushima, S., Hasegawa, R., Kato, T., Tanaka, H. and Ito, N., 1990. Effectes of sodium nitrite and catechol or 3-methoxycatechol in combination or rat stomathepithelium. *Jpn J Cancer Res*, **81**, pp. 857-61.
- Hoffler, U., El-Masri, H.A., Ghanayem, B.I., 2003. Cytochrome P450 2E1 (CYP2E1) is the principal enzyme responsible for urethane methabolism : Comparative studies using CYP2E1-null and wild-type mice. *J Pharmacology, Exp Ther.* 307, 1243.
- Il'inskii, A.P., Reutov, V.P., Ryzhova, N.I., Kolpakova, A.S., Deriagina. V.P., Nekrasova, E.A., Sovluchinskaia, L.A. and Travkin, A.G., 2000. Modifying effect of nitrites on pulmonary blastogenesis and viral leukogenesis in mice: role of nitric oxide and dioxide. *Vestn Ross Akad Med Nauk*, **7**, pp. 11-6.
- Imianitov, E.N., Togo, A.V., Anisimov, V.N., 1999. Search for Ki-ras codon 61 mutations in lung adenomas induced in neonatal BALB/C mice with 5-bromodesoxyuridine injection followed by urethane treatment. *Vopr Onkol.* **45**, pp. 542-5.
- Kawano, R., Nishisaka, T., Takeshima, Y., Yonehara, S. and Inai, K., 1995. Role of point mutation of the k-ras gene in tumorigenesis of B6C3F1 mouse lung lesions induced by urethane. *Jpn J Cancer Res*, **86**, pp. 802-10.
- Koujiti, T., Yasuhara, K., Tamura, T., nodera, H., Takagi, H., Takizawa, T., Hirose, M., Hayashi, Y. and Mitsumori, K., 2001. Lack Luca D, Luca V, Cotor Fl, Raileanu L., 1987. In vivo and in vitro cytogenetic damage induced by sodium nitrite. *Mutation Research*, **189**, pp. 333-339.
- Maekawa, A., Kamiya, S. and Odashima, S., 1976. Tumors of the upper digestive tract of ACI/N rats given N-propyl-N-