

وضعیت مراکز موجود ارائه‌ی خدمات سلامت باروری به نوجوانان و جوانان در ایران

فاطمه رمضان زاده : استاد، گروه زنان، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و لیصر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

فديه حق الله: کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و لیصر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران - نویسنده رابط : Fedyeh_hagh@yahoo.com

مامک شریعت: استادیار، مرکز تحقیقات مادر-جنین - نوزاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

مینو السادات محمود عربی: پزشک عمومی، دفتر سلامت جمعیت، خانواده، مدارس معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران ، ایران

حامد حسینی: دانشجوی دوره دکترای اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

مینا جعفر آبادی : استادیار، گروه زنان، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و لیصر، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران، ایران

محمد اسماعیل مطلق: دانشیار، دفتر سلامت جمعیت، خانواده، مدارس معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران ، ایران

گلایل اردلان: پزشک متخصص، دفتر سلامت جمعیت، خانواده، مدارس معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران ، ایران

علیرضا وثیق: پزشک عمومی، صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) ، تهران ، ایران

فهیمه سوهانی: کارشناس، صندوق جمعیت سازمان ملل، تهران، ایران

تاریخ دریافت : ۱۳۸۷/۴/۱۵ تاریخ پذیرش : ۱۳۸۸/۸/۲۶

چکیده

زمینه و هدف: نسبت بالای جمعیت جوان در کشور و فقدان برنامه جامع و مدون در زمینه سلامت باروری نوجوانان و جوانان، برنامه ریزان بهداشتی را بر آن داشت، طی مطالعه توصیفی- تحلیلی، کلیه مراکز سلامت باروری ارائه شده به نوجوانان و جوانان در ایران را ارزیابی نمایند تا نقاط ضعف و قوت برنامه های موجود و کاستی های مراکز موجود شناسایی شود.

روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی، در سال ۱۳۸۵ طبق همانگی با معاونت بهداشتی چند دانشگاه علوم پزشکی از طریق اداره سلامت نوجوانان-جوانان و مدارس معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی به انجام رسید. در این مطالعه مراکز بهداشتی- درمانی شهرهای تهران، سمنان، بم، چابهار و فسا، تنها مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشت باروری به جوانان و نوجوانان در ایران بودند، از نظر خصوصیات فیزیکی، رضایت شغلی پرسنل شاغل در این بخش، رضایت نوجوانان از خصوصیات فیزیکی مراکز و چگونگی ارائه خدمات و مشاوره مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات بر اساس پرسشنامه و چک لیست تدوین شده، گردآوری شده و توسط نرم افزار SPSS V.13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: ۶۴٪ از پرسنل شاغل در این مراکز رضایت شغلی داشتند و از نظر کارشناسان کیفیت ارائه خدمت در مراکز دارای نواقص و کمبودهایی بود (کیفیت صندلی ها، وجود امکانات سرگرم کننده در سالن، نظافت سرویس های بهداشتی، تجهیزات اتاق معاینه). در این مراکز ۳۵ نفر (۳۹٪) نوجوانان-جوانان ابراز رضایت کامل و ۴۸ نفر (۵۴٪) رضایت نسبی و ۷ نفر (۸٪) ناراضی بودند. بالاترین میزان رضایت از برخورد روانشناس، پزشک، ماما و تسلط علمی انها بر موضوع و آموزش فردی بود، به طوری که ۹۵٪ آنها چنین مراکزی را به سایر نوجوانان-جوانان توصیه می کنند و از سوی دیگر در بسیاری از مراکز پرسنل متبحر غیرپزشک مانند کارشناس ارشد مامایی (۱۷/۵٪) و تغذیه (۵۰٪) کم بود.

نتیجه گیری: وضعیت مراکز موجود ارائه دهنده خدمت به نوجوان و جوان در ایران از نظر احراز کمیت های فیزیکی مراکز دوستدار نوجوان و جوان بر اساس چک لیست، در گروه متوسط و ضعیف بود.

وازگان کلیدی: نوجوان، بهداشت باروری، رضایت از خدمات، کیفیت ارائه خدمات، رضایت پرسنل

مقدمه

اختصاصی نیاز دارند. بنابراین در راستای برآوردن نیازهای بهداشتی و درمانی کشورها، شناخت و بررسی رضایت جامعه از طریق پژوهه‌های تحقیقاتی بسیار ضروری به نظر می‌رسد و در این بین رضایت مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی شاخص بسیار مهمی جهت ارزیابی کیفیت و نحوه ارائه خدمات توسط کادر پزشکی و پرسنل وابسته می‌باشد و از دستاوردهای نهایی و مطلوب گسترش مراقبت بهداشتی و خدمات درمانی در جامعه محسوب می‌گردد.

مسلمان در امر مراقبت، رضایت بیماران زمانی حاصل می‌شود که توافق و مجانست بین انتظارات بیماران از یک سو و مراقبت‌های دریافت شده از سوی دیگر موجود باشد و مراقبت‌های به طور کامل با توجه به نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی بیماران ارائه گردد.

از آنجا که نو جوانان و جوانان برای حفظ سلامت خود و به ویژه باروری شان از اطلاعات، تجربه و امکانات کمتری نسبت به بزرگسالان برخوردارند و در معرض خطر بیشتری قرار دارند، لازم است تا اهمیت خاصی برای سلامت باروری نو جوانان و جوانان در برنامه‌های بهداشت باروری در نظر گرفته شود.

بنابراین نسبت بالای جمعیت جوان در کشور و نبود برنامه جامع و مدون در زمینه سلامت باروری نو جوانان و جوانان، برنامه ریزان بهداشتی را برآن داشت تا طی مطالعه‌ای که کلیه خدمات سلامت باروری ارائه شده به نوجوانان و جوانان را ارزیابی نموده بودند (Ahmadizad 2006) ، نقاط ضعف و قوت و کاستی‌های مراکز موجود شناسایی شود و استراتژی‌هایی جهت خدمات دهی به جوانان و نوجوانان طراحی گردد. تا برطبق تعریف WHO هر انسانی حق دسترسی به بالاترین حد استانداردهای سلامت را داشته (Haller et al. 2007; Braeken et al. 2007; Tylee et al. 2007) و بتوان در چهارچوب بهداشت باروری به ارتقای سلامت جنسی، پیشگیری از بیماری مقابله و

مراقبت (Care) یکی از مهم ترین و اساسی ترین اجزاء دستیابی به تکامل و بقای انسان می‌باشد. هیچ درمانی بدون مراقبت نمی‌تواند باشد در حالیکه مراقبت بدون درمان وجود دارد. برآورده شده است که بیش از نیمی از خدمات بهداشتی معرف مراقبت و بقیه آن معرف درمان می‌باشد و لازم است تأکید بیشتری بر امر مراقبت صورت گیرد. در ارائه مراقبت‌ها مسئله مهمی که امروزه همواره مورد توجه قرار می‌گیرد دستیابی به کیفیت مطلوب ارائه مراقبت و جلب رضایت مراقبت شوندگان می‌باشد که این امر یکی از مسئولیت‌های مهم مدیران و کارکنان شاغل در حرفة ای خدمات بهداشتی و درمانی محسوب شده و روز به روز اهمیت بیشتری می‌یابد.(Kohan 2003) سه مشخصه‌ی تساوی (Equity)، دسترسی و قابل قبول بودن کیفیت مراقبتهای بهداشتی را تعیین می‌نماید.(مطابق تعریف WHO) منظور از Equity عدالت در ارائه ای خدمات بهداشتی به همه متقاضیان توسط کارکنان و مراقبین بهداشتی می‌باشد، منظور از دسترسی شامل دسترسی رایگان، ساعتهای مناسب برخورداری از این مراکز، محل مناسب، اطلاع رسانی درخصوص وجود این مراکز و حمایت دیگر ارگانها و قابل قبول بودن از نظر متقاضی شامل مشخصاتی نظری اعتماد، محرومانه بودن، دادن اطلاعات و فرصت کافی Papanicolas et al. (2008) جهت هر متقاضی می‌باشد (Papnicolas et al. 2008) عمدۀی خدمات بهداشت باروری انجام شده در کشور ما توسط سیستم مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC) انجام می‌شود. با توجه به گستردگی پوشش خدمات PHC این امر یک نقطه قوت به حساب می‌آید، اما از سوی دیگر این به آن معنی است که خدمات تخصصی تر از سطح PHC به میزان کافی در دسترس نیستند. ضمن آنکه خدمات PHC به عنوان تسهیلات عمومی به حساب می‌آید و اختصاصاً جهت خدمات رسانی به نوجوانان طراحی نشده است. اما نوجوانان و جوانان به مرکز و خدمات

داده‌ها پس از جمع آوری در بانک اطلاعاتی نرم افزار SPSS V-13 ذخیره شد و توسط کارشناسان آمار، آمار توصیفی به صورت فراوانی نسبی و مطلق، میانگین و انحراف معیار و آمار تحلیلی جهت مقایسه‌ها با استفاده از آزمون آماری مجنور کای استخراج شد.

ابزارهای اندازه گیری عبارت بودند از: چک لیست و پرسشنامه باز و بسته (پرسشنامه با سوال تشریحی و با سوالات کد بندی شده)، چک لیست و پرسشنامه فوق الذکر با بررسی متون سایر مطالعات در اقصی نقاط دنیا تهیه شد. جهت ارتقاء اعتبار آن در جلسه مشکل از ۷ صاحب نظر تجدید نظر شد و بر روی ۱۰ نمونه بصورت آزمایشی نیز ارزیابی شد) آلفای کرونباخ ۰/۷۰ بدست آمد) پس از آن پرسشنامه نهايی به منظور جمع آوری داده‌ها تکثیر شد.

سنجرش متغیرها از طریق مشاهده مصاحبه با پرسنل شاغل و تعدادی از مراجعان نوجوان- جوان صورت گرفت. بنابراین علاوه بر چک لیست تکمیل شده در هر مرکز و مصاحبه با کلیه پرسنل آن واحد از طریق روش نمونه گیری آسان، از تعدادی از افراد گروه هدف، نیز مورد مصاحبه قرار گرفتند.

لازم به ذکر است که رضایت مشتری بر اساس امتیاز به دست آمده از پرسشنامه مربوطه که حاوی ۴۱ سوال کدبندی شده (۵-۰) بود، ارزیابی شد، به قسمی که با توجه به حداقل امتیاز ۲۰۵؛ امتیاز بیشتر و مساوی ۱۴۵ ارضا شده کامل، امتیاز ۱۴۴-۱۰۰ ارضا شده نسبی و امتیاز کمتر از ۱۰۰ ناراضی در نظر گرفته شد. همچنین رضایت شغلی پرسنل با کدبندی سوالات از (۵-۰) بر اساس ارزیابی شخصی امتیاز داده شد. بطوری که هنگام آنالیز و پس از ادغام: امتیاز ۴۰= راضی، امتیاز ۳= نسبتاً راضی و امتیاز ۲= ناراضی در نظر گرفته شد. ارزیابی وضعیت مراکز بر اساس چک لیست مطابق استانداردهای بین المللی مراکز دوستدار نوجوان ارزیابی و توسط کارشناسان (۵ کارشناس) بررسی شدو در مجموع علاوه بر محاسبه فراوانی نسبی هر مورد به تنها، با

حامگی‌های ناخواسته و پیشگیری از سقط نائل شد (Braeken et al. 2007)

روش کار

در سال ۱۳۸۵ طی هماهنگی با معاونت بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی چند شهر از طریق اداره سلامت نوجوانان- جوانان و مدارس معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی و با اجازه از سوی آن معاونت و مدیریت مراکز، همکاری و هماهنگی‌های لازم جهت بازدید و ارزیابی مراکز صورت گرفت.

مراکز ارزیابی شده در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی عبارت بودند از: چهار مرکز بهداشتی- درمانی در تهران (اکباتان، ابوذر، یافت آباد و شمال)، دو مرکز بهداشتی- درمانی در سمنان (شهید مطلبی، شهید فریدون فامیلی)، یک مرکز در چابهار و یک مرکز در فسا بودند.

لازم به ذکر است که در ایران فقط ۹ مرکز این خدمات را ارائه می‌دهند که در این پرژه هر ۹ مرکز بررسی شدند و در هر مرکز در بدو ورود، تعداد پرسنل (درمانی و اداری) با توجه به تخصص و تبحر آنان، عملکرد (رعایت) موارد بسته خدمات مشاوره، آموزشی، درمانی و نحوه برخورد با مشتری، ابعاد فضای فیزیکی، تهویه، نور، تعداد اتاق‌ها، امکانات جذابیت مرکز، دسترسی به آب آشامیدنی و سرویس‌های بهداشتی و نظافت محل، نوع و کیفیت داروهای عرضه شده، موقعیت جغرافیایی مرکز در شهر مربوطه (چگونگی سهولت دسترسی به مرکز)، مدت زمان سپری شده جهت پذیرش مشتری، انتظار و میزان هزینه دریافت شده از مشتری، رضایت شغلی پرسنل و رضایت مشتری از خدمات ارائه شده، سازمانهای حمایت کننده پشتیبان، خدمات رفاهی- اجتماعی ارائه شده به مشتری، زمان فعالیت مرکز با توجه به چهارچوب اجرایی تنظیم شده (چک لیست و پرسشنامه‌ها)، ارزیابی گردید.

نتایج

در این تحقیق، ۹ مرکز موجود در ایران که خدمت مورد بحث را به جوانان و نوجوانان ارائه می دهند (۴ مرکز در تهران و ۵ مرکز شهرستانی) بررسی شدند. جداول ۱ و ۲ به تفکیک هر مرکز خصوصیات پرسنلی و کیفیت مراکز بر مبنای استانداردهای تعیین شده را نشان می دهند.

در سه مرحله، رضایت مندی کارکنان، نوجوانان و کیفیت و استاندارد مراکز مراجعه کننده ارزیابی شد که نتایج جمع بندی شده کل مراکز به شرح زیر می باشد:

در کل مراکز از ۵۰ پرسنل شاغل (در هر مرکز تعداد پرسنل از ۷-۴ نفر متغیر بود) میانگین سن پرسنل: 35.1 ± 9.2 سال، میانگین مدت خدمت: 11.5 ± 9.5 سال و اکثرا یا ۵۰ نفر (۹۰٪) دارای تحصیلات دانشگاهی بودند و ۶۸٪ پرسنل آموزش های خاص دوران نوجوانی را دیده بودند.

عمده فعالیت پرسنل در این مراکز به ترتیب: مشاوره ای، درمانی و اداری است و در دسته بندی رضایت پرسنل (مدت زمان کار، موقعیت مکانی مرکز، نحوه پرداخت حقوق، حقوق دریافتی) کلا ۲ نفر (۱۰٪) ناراضی، ۱۳ نفر (۲۶٪) رضایت نسبی و ۳۲ نفر (۶۴٪) از پرسنل شاغل در این مراکز رضایت شغلی داشتند (جدول ۳).

رضایت شغلی کارکنان بطور معنا داری با انتخاب شغل بر حسب علاقه و انگیزه رابطه داشت، بطوری که در افراد با داشتن انگیزه بالا و علاقه مند به کار، ۲۶ نفر (۷۱٪) افراد با انگیزه کاملا راضی، ۹ نفر (۲۶٪) آنها تا حدی راضی و ۱ نفر (۲٪) ناراضی بودند ($p < 0.04$).

همچنین رضایت شغلی بطور معنا داری با تحصیلات رابطه داشت بطوری که ناراضیتی در گروه با تحصیلات بالاتر بیشتر بود (۳ مورد ۲۵٪) در گروه با تحصیلات بالاتر در مقابل ۲ نفر (۵٪) در گروه با تحصیلات پایین تر ($p < 0.006$) (جدول ۳) در ارتباط با وجود نیروی انسانی متبحر و آموزش دیده در حیطه های گوناگون، ارائه خدمات تنظیم خانواده خاص نوجوانان، پزشک مشاوره دهنده در خصوص مهارتهای

دسته بندی موارد، امتیاز جداگانه محیط فیزیکی از مجموع امتیازاتی که از ارزیابی مواردی مانند دسترسی به مرکز، علائم راهنمایی، نظافت سالن انتظار، نور و تهویه سالن و اتاقها، نظافت سرویس بهداشتی (دامنه امتیاز از ۲۰-۱۰) بدست آمده بود محاسبه شد. همانند این رویه در دستیابی امتیاز جداگانه تجهیزات مجموع امتیازات مواردی چون امکانات سرگرمی، آبسردکن، تعداد و کیفیت صندلی و تجهیزات اتاق معاینه (دامنه امتیاز از ۲۰-۱۰) و نیز امتیاز جداگانه خدمات از مجموع نمرات موارد زمان ویزیت، نظم حضور پرسنل، رعایت نوبت، تردود شلوغی، نوع برخورد نگهبان، مسئول پذیرش، ماما، روانشناس، پزشک و زمان سپری شده برای معاینه، مشاوره، پاسخگویی به سوال و آموزش گروهی، فردی و تسلط علمی کلیه پرسنل به تفکیک، یاد آوری زمان ویزیت بعدی و مشاوره تلفنی (دامنه امتیاز از ۲۶-۱۳) حاصل شد. کیفیت مطلوب در دسته بندی محیط قیزیکی و تجهیزات امتیاز بالاتر از ۱۷، کیفیت متوسط امتیاز ۱۵-۱۷ و کمتر از ۱۵ نامطلوب محسوب شد. کیفیت مطلوب در دسته بندی خدمات نیز امتیاز بالاتر از ۲۴، کیفیت متوسط امتیاز ۱۹-۲۴ و کمتر از ۱۹ نامطلوب محسوب شد.

براساس امتیاز حاصل از چک لیست ارزیابی وضعیت مراکز که توسط مراجعان تکمیل شده و حاوی ۵۰ سوال (۲۰ امتیازی) بود، فراوانی رضایت از هر مرکز جداگانه محاسبه شد با توجه به حداکثر امتیاز ۱۰۰، و بر مبنای معیار تقسیم بندی پیشنهادی صاحب نظران این مطالعه امتیاز بیش از ۷۰ وضعیت موجود را مناسب، امتیاز ۶۹-۴۵ را نسبتاً مناسب و امتیاز کمتر از ۴۵ نامناسب در نظر گرفته شد. بر اساس اهداف، آمار توصیفی و تحلیلی بر اساس آزمون مجدد کای و تی تست استفاده شد.

بحث

در بازدید از مراکز، کیفیت ارائه خدمات در مراکز بر اساس چک لیست مطابق استانداردهای بین المللی مراکز دوستدار نوجوان ارزیابی گردید. در مجموع با کارشناسی بر اساس چک لیست وضعیت مراکز موجود ارائه دهنده خدمت به نوجوان و جوان در ایران، از نظر احراز کمیت‌های فیزیکی مراکز دوستدار نوجوان به جوان در گروه متوسط و ضعیف بود. چنانچه در مطالعه دکتر احمدزاد و همکاران نیز (در گروه نسبتاً ضعیف) قرار گرفته بود(Ahmadizad 2006).

مهمنترین ضعف مراکز مورد بررسی کاهش کیفیت، بهداشت نا مناسب برخی مراکز، کمبود پرسنل متبحر با تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته‌های مامایی، تغذیه و روانشناسی، کمبود امکانات مشاوره تلفنی و عدم فعالیت بیشتر مراکز در ساعت بعد از ظهر می‌باشد.

مراکز مورد بررسی اغلب در ساعتی که نوجوان و جوان در مدرسه یا محل کار هستند، باز می‌باشند و در ساعتی که نوجوان و جوان می‌توانند برای دریافت خدمات مراجعه کنند، مراکز محدودی جهت ارائه‌ی خدمات، دایر می‌باشند. می‌توان این مساله را در کنار اطلاع رسانی ضعیف از عوامل مهم کم بودن مراجعات نوجوانان و جوانان به این مراکز بحساب آورد.

البته سهولت تعیین وقت در این مراکز و موقعیت مکانی آن، که معمولاً نزدیک به مراکزی است که جوانان در آن رفت و آمد دارند و کمتر از یک ساعت فاصله زمانی دارند، از نقاط قوت مراکز مورد بررسی می‌باشند. چنانکه در مطالعه دکتر احمدزاد و همکاران نیز به این مورد اشاره شد(Ahmadizad 2006).

همچنین در مطالعات انجام شده، وجود تجهیزات و امکانات استاندارد این مراکز، به عنوان عامل افزایش کیفیت خدمات به جوان و نوجوان مطرح می‌شوند (Kohan et al. 2003; Sovd et al. 2006)، مطالعه دیگر در انگلستان نشان داد که دریافت کنندگان خدمات دوستدار جوان-نوجوان از ارائه‌ی خدمات و مکان و زمان دسترسی راضی یا بسیار راضی بودند. (Tylee et al. 2007) همچنین

زندگی و مشکلات روانشناختی کمتر از حد انتظار بود بطوري که روانشناس در ۷۰٪، کارشناس تغذیه در ۵۰٪، کارشناس ارشد مامایی در ۱۷/۵٪ مراکز دیده شد.

از مجموع ۹۱ نوجوان از ۹ مراکز مورد بررسی (در هر مراکز تقریباً ۱۰ نفر)، ۶۹ نفر (۷۵٪) نوجوان پاسخ دهنده دختر و ۲۲ نفر (۲۵٪) پسر بودند. میانگین سنی آنها 5 ± 3 سال برآورد شد. ۲۹ نفر (۳۲٪) بیشترین از سوی مدارس و ۱۶ نفر (۱۷٪) (کمترین) ارجاع از مراکز بهداشتی را داشته اند و بقیه مواردی همچون ارجاع به طور شخصی و یا موارد دیگر بود. میانگین امتیاز رضایت جوان و نوجوان از موقعیت فیزیکی و خدماتی در کل مراکز مورد بررسی $\pm 18/5$ بود. (۹۱/۳-۵۴/۳) که با توجه به کل نمرات داده شده، در ردیف ناراضی در نظر گرفته شد. در این مراکز ۳۵ نفر (۳۹٪) نو جوانان-جوانان دارای رضایت کامل و ۴۸ نفر (۵۴٪) رضایت نسبی و ۷ نفر (۸٪) ناراضی بودند. در مجموع ۹۳٪ رضایت کلی و نسبی از استقرار چنین مراکزی و در تقسیم بندهی به گروه راضی و ناراضی، اکثریت نوجوانان از وضعیت مراکز که شامل (دسترسی به مراکز، علائم راهنمایی معرفی مراکز، زمان ویزیت، نظم حضور کارکنان، تجهیزات و رفتار کارکنان) رضایت داشتند. بالاترین رضایت از نحوه رفتار روانشناس (۹۲٪)، پیشک (۸۹٪)، ماما (۸۸٪) و تسلط علمی انها بر موضوع و آموزش فردی (حدود ۸۰٪) بود، بطوري که آنها ۹۵٪ آنها چنین مراکزی را به سایر نوجوانان-جوانان توصیه می‌کنند (جدول ۴).

در ارزیابی وضعیت مراکز بر اساس چک لیست نظرسنجی کارشناسان، کیفیت فیزیکی و ارائه خدمت در مراکز دارای نواقص و کمبودهایی بود (کیفیت و تعداد نامناسب صندلی‌ها ۲۵٪)، عدم وجود امکانات سرگرم کننده در سالان (۴۷/۵٪)، کمبود نظافت سرویس‌های بهداشتی (۶۵٪)، تجهیزات ناکافی اتاق معاینه (۶۰٪). بطور کل کیفیت در ۴۰٪ مراکز در حد خوب و در ۶۰٪ ضعیف بود. میانگین کل امتیازات مراکز $52 \pm 8/6$ (۸۰-۶۳) بود.

باید توجه داشت که یکی از مهمترین بخش‌های برنامه ریزی برای سلامت، رساندن خدمات به گروههایی است که به طور معمول از خدمات سلامتی کم بهره می‌باشند. لذا پوشش آموزشی مناسب برای نوجوانان و جوانان متاهل، کسانیکه به هر دلیل مدرسه را ترک کرده اند و در سنین پایین مشغول بکار هستند از اهمیت خاصی برخوردار است.

بر اساس چک لیست تهیه شده، وضعیت درمانگاه‌ها از نظر رعایت اصول بهداشتی و امکانات، مطابق پروتکل استاندارد و مورد قبول سایر نقاط WHO، مراکز امکانات کافی را ندارند.

لازم به ذکر است که چالش‌ها، سختی‌ها و موانع موجود بر سر راه ارائه خدمات سلامت باروری به نوجوانان و جوانان، نسبت به آنچه در ارائه همین خدمات به بزرگسالان وجود دارد بسیار متفاوت است، جهت ارائه خدمت به نوجوانان و جوانان به عنوان دریافت کنندگان خدمات سلامت باید از روش‌های تخصصی استفاده نمود، که از آنها می‌توان به ویژگی فیزیکی مرکز، ویژگی‌های کارکنان وارائه کنندگان خدمات و ویژگی فرایندها و امور اجرایی اشاره نمود.

با توجه به این که افراد تحت مطالعه بالاترین رضایت را از امکانات مشاوره‌ای و روانشناسی ابراز کردند(۸۶٪ و ۸۸٪) و از سویی در بسیاری از مراکز پرسنل متبحر غیر پزشک مانند کارشناس ارشد مامایی و تغذیه کم می‌باشد(۱۷/۵٪ و ۵۰٪) چنین به نظر می‌رسد، که در این مراکز به تمام ابعاد نیازهای یک نوجوان- جوان مانند نیاز تغذیه- مسائل دوران بلوغ کمتر توجه شده است.

مشکل عمده در این مراکز عدم وجود روانشناس- روانپزشک و کارشناس تغذیه (بجز در تهران- شمیرانات) است که برای نوجوان و جوان الزاماً واجب است.

نوجوانان و جوانان از وجود چنین مراکزی ابراز رضایت می‌نمودند و خواهان محramانه بودن اطلاعات می‌باشند اما رضایت کافی از تبحیر پرسنل ندارند چرا که پرسنل آموزش‌های کافی و لازم را ندیده اند و مراکز به نیروهای متخصص بیشتری نیاز دارند.

نظرسنجی از نوجوانان و جوانان در چند مطالعه انجام شده، نشان دادکه نوجوانان خواهان مراکز بهداشتی با محیط فیزیکی مناسب و خوب می‌باشند (Sovd et al. 2006; Kohan 2003; Lindberg et al. 2006).

در ارتباط با سنجش رضایت جوانان و نوجوانان، انجام چندین مطالعه در کشورهای مختلف نشان داد که داشتن فضای فیزیکی، اطلاع رسانی از وجود چنین تسهیلات و خصوصی بودن (مراکز خاص نوجوانان و جوانان) از جنبه‌های مختلف رضایت نوجوانان از چنین Sovd et al. 2006; Ahmadizad 2006; Lindberg et al. 2006; Zimmer-Gembeck et al. 1997; Wilf-Miron et al. 2002; Halevy et al. 1995

میانگین امتیاز رضایت جوان و نوجوان از وضعیت فیزیکی، درمانی و مشاوره‌ای مراکز در کل مراکز مورد بررسی، $18/5 \pm 72/8$ بود (۹۱/۳-۵۴/۳)، همچنین در مجموع ۹۳٪ نوجوانان و جوانان در مراکز رضایت کلی و نسبی از استقرار چنین مراکز خدماتی داشتند، لذا به نظر می‌رسد مراکز بهداشتی با محیط فیزیکی مناسب تر از عوامل مهم رضایت نوجوانان محسوب می‌شود.

ارائه‌ی خدمات آموزشی به صورت رایگان از مهمترین نقاط قوت در این مراکز می‌باشد که باید در جهت حفظ و تقویت این مزیت کوشید.

همچنین تعیین وضعیت برنامه‌های موجود در این مطالعه نشان داد که پسران در مقایسه با دختران خدمات آموزشی کمتری در یافت می‌دارند و این امر بخشی ناشی از مقاومت عمومی پسران و مردان جوان برای دریافت آموزشها و خدمات مرتبط با سلامت و بخشی ناشی از کاستی‌های برنامه ریزی در جهت آموزش پسران می‌باشد. در این مطالعه همانند مطالعه دکتر احمد زاد اکثریت قریب به اتفاق نوجوانان و جوانان مجرد و دانش آموز بودند و بنابراین نوجوانان و جوانان متاهل غیردانش آموز و شاغل از خدمات آموزشی کمتری در مقایسه با همسالان مجرد، دانش آموز و غیرشاغل خود بهره مندند.

طی آن مراکز مختلف، برنامه هایشان را بر اساس یک چارچوب مشخص و واحد انجام دهنده، (نه بر حسب سلائق و قابلیت های مرکز) باید. در این بسته، برنامه های بهداشت باروری در نظام آموزشی کشور ادغام گردد و ضمن حفظ محوریت وزارت بهداشت در برنامه ریزی، اجرا و پیاده شدن محتویات بسته مذکور، لازم است تا مشارکت سایر نهادها، بخصوص وزارت آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی جلب شود. به علاوه برای پایش عملکرد مراکز و برقراری و حفظ استانداردها، لازم است تا یک نظام ارزشیابی خارجی مستمر، برفعالیت های این مراکز و نحوه ارائه خدمات مربوط نظارت کند.

در این مطالعه بررسی کیفیت خدمات درمانی؛ مشاوره ای به دلیل وسعت اهداف بررسی شده، مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفت که از محدودیت های مطالعه حاضر بود، لذا انجام مطالعات دیگر در این زمینه توصیه می شود.

باتوجه به موارد فوق و اولویت ها و تدوین راهبرد خاص نوجوان- جوان، مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت، هر انسانی حق دسترسی به بالاترین حد استانداردهای سلامت را خواهد داشت و در چارچوب بهداشت باروری و سیاست گذاری و پشتیبانی از ارائه ی خدمات در (مدارس، جوامع محلی) با کسب مهارت های زندگی و آموزش همسالان می توان به ارتقای سلامت جنسی و جسمی، پیشگیری از بیماری مقابله کنی، سقط و حاملگی های ناخواسته نائل شد.

تشکر و قدردانی

این طرح با حمایت مالی صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) و با همکاری مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - معاونت سلامت (اداره سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس) و مرکز تحقیقات بهداشت باروری و لیعصر انجام شده است و جا دارد که از کلیه همکاران این پروژه و پرسنل محترم مراکز بهداشتی ذکر شده تشکر و تقدیر شود.

همچنین در این بررسی، مطابق مطالعه احمدی زاد (Ahmadizad 2006) ای فعلی، عدم استفاده از پرسنل آموزش دیده برای مواجهه با نوجوانان و جوانان می باشد، به این منظور می توان نیروهای موجود را آموزش داد تا ضمن ارتقای کیفیت خدمات مشاوره ای ارائه شده، صرفه جویی قابل توجهی در منابع صورت گیرد. علاوه بر این خدمات مشاوره ای در حال حاضر عمده ای به صورت حضوری و با مراجعه به مراکز مربوطه صورت می گیرد. ایجاد و گسترش روشهای خلاقانه تر مانند خطوط تلفن آزاد، صندوق های پستی و سایر روش ها می توانند پوشش خدمات مشاوره ای را به طرز چشمگیری افزایش دهد.

امکان ارجاع به مراکز تخصصی تر و نیز رایگان بودن خدمات مشاوره ای از نقاط قوت و مهمن خدمات موجود می باشد که باید در جهت حفظ و تقویت آن تلاش کرد. چنانچه یافته های مطالعات کشورهای مختلف نیز نیاز مبرم نوجوان را با اتخاذ سیاستهای نظیر وجود چارچوبهای اختصاصی، ایجاد تغییرات در سیستمهای مراقبتی اولیه و آموزش نوجوان و جوان، معلمین، والدین و سایر گروه های درگیر و قابل اعتماد بودن به مراکز بهداشتی- درمانی را برای این گروه سنی نشان می دهد Zeanah et al. 2006; Jarusericiene et al. (1996).

نتیجه گیری

بنابراین ادغام برنامه های آموزشی بهداشت باروری در برنامه مدارس یکی از کلیدهای موفقیت در ارتقای سلامت باروری نوجوانان و جوانان محسوب می شود. به علاوه آموزش معلمان یکی از مصادیق استفاده بهینه از نیروهای موجود و صرفه جویی در منابع می باشد، لذا پیشنهاد می شود یک بسته ای جامع خدماتی آماده گردد که

جدول ۱- خصوصیات "مراکز مورد بررسی خدمات به نوجوانان و جوانان": مشخصات کارکنان

نام مرکز	کارکنان	سن	تعداد(درصد)	تعداد سالهای فعالیت						تحصیلات	جنس	تعداد(درصد)				
				دیپلم			دانشگاهی									
				میانگین(انحراف معیار)	درمانی مشاوره ای	درمانی سمنان	میانگین(انحراف معیار)	مرد	زن							
فamilی سمنان	(۷۰)۴	(۳۰)۲	(۹/۵۶)۱۷/۲۰	(۴۰)۳	(۶۰)۲	(۱۰۰)۶	۰	(۱۰/۱۶)۳۹/۴۰	۰	(۹/۵۶)۱۹/۶۰	(۵۰)۳	(۵۰)	(۱۰۰)۵			
مطلبی سمنان	(۲۰)۱	(۸۰)۴	(۷/۶۳)۱۹/۶۰	(۷۵)۴	(۲۵)۱	(۷۵)۴	۰	(۴/۸۹)۴۴	۰	(۱۱/۸۹)۱۳/۵۰	(۱۰۰)۵	۰	(۱۰/۸۰)			
ابوذر	(۷۵)۳	(۲۵)۱	(۶/۵۷)۳۶/۲۰	(۸/۲۸)۳۸/۱۶	(۱۶)۱	(۸۴)۵	(۱۶)۱	(۱۳/۵۹)۳۵/۴۲	۰	(۱۴/۷۹)۱۶/۲۵	(۷۱)۷	(۲۹)۲	(۱۰۰)۷			
شمال تهران	(۱۶)۱	(۸۴)۵	(۶/۹۶)۲۹/۰۰	(۴۰)۲	(۶۰)۳	(۶/۲۶)۴/۶۲	(۶۰)۳	(۴۰)۲	(۷۵)۳	(۰/۹۸)۲/۲۵	(۸۶)۶	(۱۴)۱	(۵۷)۴			
اکباتان	(۲۹)۲	(۷۱)۵	(۱۳/۵۹)۳۵/۴۲	(۱۰۰)۷	۰	(۱۰۰)۶	۰	(۱۰/۲۰)۲۷/۰۰	۰	(۷/۸۲)۱۱/۴۰	(۱۰۰)۵	۰	(۴۰)۲			
یافت آباد	(۴۰)۲	(۶۰)۳	(۰/۹۸)۲/۲۵	(۷۵)۳	(۲۵)۱	(۷۵)۳	(۲۵)۱	(۲/۷۰)۲۷/۰۰	۰	(۰/۷۵)۰/۹۵	(۷۵)۳	(۲۵)۱	(۴۰)۲			
بم	(۱۰۰)۷	۰	(۷/۳۷)۳۸/۲۰	(۶۰)۳	(۶۰)۳	(۷/۳۷)۳۸/۲۰	(۶۰)۳	(۴۰)۲	(۷۵)۳	(۲۵)۱	۰	(۷/۸۲)۱۱/۴۰				
فسا	(۴۰)۲	(۶۰)۳	(۰/۷۵)۰/۹۵	(۷۵)۳	(۲۵)۱	(۷۵)۳	(۲۵)۱	(۲/۷۰)۲۷/۷۵	۰	۰	(۷/۸۲)۱۱/۴۰	(۰/۷۵)۰/۹۵	(۷۵)۳			
چابهار	(۷۵)۳	(۲۵)۱	(۰/۷۵)۰/۹۵	(۷۵)۳	(۲۵)۱	(۷۵)۳	(۲۵)۱	(۲/۷۰)۲۷/۷۵	۰	۰	(۷/۸۲)۱۱/۴۰	(۰/۷۵)۰/۹۵	(۷۵)۳			

جدول ۲- کیفیت "مراکز خدمات به نوجوانان و جوانان" بر حسب رعایت استانداردهای فیزیکی، تجهیزات و ارائه بسته خدمات

نام مرکز	امتیاز محیط فیزیکی (دامنه: ۱۰-۱۹)	امتیاز مطلوب فیزیکی (دامنه: ۱۰-۲۶)	امتیاز خدمت (دامنه: ۲۶-۴۰)	خدمت	تجهیزات	تجهیزات	مطلوب	امتیاز تجهیزات	امتیاز مطلوب	کیفیت مطلوب	
										خدمت	تجهیزات
فamilی سمنان	۱۳/۲۵	نامطلوب	۱۶/۵۰	متوسط	۲۳/۷۵	مطلوب	۲۳/۷۵	۱۶/۵۰	نامطلوب	۰	۰
مطلبی سمنان	۱۳/۷۵	نامطلوب	۱۵/۲۵	متوسط	۲۱/۲۵	مطلوب	۲۱/۲۵	۱۵/۲۵	نامطلوب	۰	۰
ابوذر	۱۲/۷۵	نامطلوب	۱۵/۲۵	متوسط	۲۲/۰۰	مطلوب	۲۲/۰۰	۱۵/۲۵	نامطلوب	۰	۰
شمال تهران	۱۳/۱۶	نامطلوب	۱۳/۶۶	نامطلوب	۱۷/۸۳	نامطلوب	۱۷/۸۳	۱۳/۶۶	نامطلوب	۰	۰
اکباتان	۱۳/۷۵	نامطلوب	۱۳/۵۰	نامطلوب	۱۷/۵۰	نامطلوب	۱۷/۵۰	۱۳/۵۰	نامطلوب	۰	۰
یافت آباد	۱۵/۶۰	متوسط	۱۴/۴۰	نامطلوب	۱۶/۲۰	نامطلوب	۱۶/۲۰	۱۴/۴۰	نامطلوب	۰	۰
بم	۱۱	نامطلوب	۱۳	نامطلوب	۲۰/۲۵	نامطلوب	۲۰/۲۵	۱۳	نامطلوب	۰	۰
فسا	۱۳/۵۰	نامطلوب	۱۵/۵۰	متوسط	۲۱/۰۰	نامطلوب	۲۱/۰۰	۱۵/۵۰	نامطلوب	۰	۰
چابهار	۱۳/۶۰	نامطلوب	۱۶/۲۰	متوسط	۱۸/۶۰	نامطلوب	۱۸/۶۰	۱۶/۲۰	نامطلوب	۰	۰

جدول ۳- رضایت شغلی کارکنان "مراکز خدمات به نوجوانان و جوانان"

متغیر	افراد کاملاً راضی						افراد ناراضی						P-value
	افراد ناراضی			افراد نسبتاً راضی			افراد کاملاً راضی			تعداد			درصد
جنس													
مرد	۹	۹۰	۰	۰	۵۷/۵	۲۳	۲۳	۱۲	۵۹/۵	۲۲	۰	۳۲/۴	۰/۱۹
زن	۰	۰	۰	۰	۵۷/۵	۲۳	۰	۱	۷۶/۹	۱۰	۲	۷/۷	۰/۱۹
وضعیت تأهل													
مجرد	۲۲	۵۹/۵	۱۲	۳۲/۴	۰/۱۹	۰	۰	۱	۷۶/۹	۱۰	۲	۷/۷	۰/۱۹
متاهل	۱۰	۹۰	۹	۹۰	۰/۱۹	۰	۰	۰	۵۷/۵	۲۳	۰	۰	۰/۱۹
تحصیلات													
بالاتر از دیپلم	۲۴	۶۳/۲	۱۲	۳۱/۶	۰/۰۰۰۱	۲	۲	۳۱/۶	۵۹/۵	۲۲	۳	۳۲/۴	۰/۱۹
فوق لیسانس - پزشک	۸	۶۶/۷	۱	۸/۳	۰/۰۰۰۱	۳	۳	۸/۳	۷۶/۹	۱۰	۱	۷/۷	۰/۱۹
نوع فعالیت													
درمانی	۵	۳۸/۵	۵	۳۸/۵	۰/۱۹	۱	۱	۳۸/۵	۵۹/۵	۲۲	۱	۳۲/۴	۰/۱۹
مشاوره‌ای	۲۱	۷۵	۵	۷۵	۰/۱۹	۲	۲	۱۷/۹	۷۰/۶	۲۴	۲	۷/۱	۰/۰۰۰۱
علاقمندی													
ندارد	۸	۵۰	۴	۲۵	۰/۰۴	۴	۴	۲۵	۷۰/۶	۲۴	۱	۲۶/۵	۰/۰۴
دارد	۲۴	۷۰/۶	۹	۲۶/۵	۰/۰۴	۱	۱	۲۶/۵	۵۷/۵	۲۳	۰	۰	۰/۰۷
دریافت پاداش													
بلی	۲	۱۰۰	۰	۰	۰/۰۷	۰	۰	۰	۵۷/۵	۲۳	۵	۳۰	۱۲/۵
و تشویق													
خیر	۲۳	۵۷/۵	۱۲	۳۰	۱۲/۵	۵	۵	۳۰	۵۷/۵	۲۳	۰	۰	۰/۰۷

جدول ۴ - توزیع فراوانی نسبی نارضایتی نوجوانان مراجعت کننده از سرویس خدمات سلامت باوروی به نوجوان - جوان

موارد	درصد	موارد	درصد	موارد	درصد	موارد	درصد	موارد	درصد	موارد	درصد	موارد	درصد
توصیه به مراجعه	۵	نحوه برخورد پزشک	۱۱	تردد و شلوغی در اتاق معاینه	۲۳	نظافت سرویس های	۳۴	جهت این مرکز	۰/۲۰	موارد نارضایتی بیش از ۳۰%	٪۲۰-۳۰	موارد نارضایتی	٪۱۰-۲۰
نحوه برخورد	۸	نحوه برخورد ماما	۱۲	نظافت اتاق معاینه	۲۳	و مشاوره	۰/۰۷	روانشناس	٪۰-۱۰	موارد نارضایتی کمتر از ۱۰%	٪۰-۱۰	موارد نارضایتی	٪۰-۱۰
روانشناس		زمان سپری شده برای	۱۳	تجهیزات اتاق معاینه	۲۲	بهداشتی	۰/۰۷	دسترسی به مراکز		نحوه اموزش فردی	۱۲	تجهیزات اتاق معاینه	۰/۰۷
		معاینه	۱۲	تسليط علمی پزشک یا ماما	۲۲			نحوه اموزش فردی		تسليط علمی روانشناس	۱۲	تسليط علمی مشاور	۰/۰۷
		دسترسی به مراکز	۱۷	رعایت نوبت	۲۴			نحوه اموزش فردی		زمان سپری شده برای	۱۳	نور سالن انتظار	۰/۰۷
		زمان سپری شده برای	۱۷	کفايت تعداد صندلی ها در	۲۴			نحوه اموزش فردی		مشاوره	۱۷	کفايت تعداد صندلیها در اتاق	۰/۰۷
		مشاوره	۱۷	اتاق ها	۲۴			نحوه اموزش فردی		نور سالن انتظار	۱۹	تسليط علمی مشاور	۰/۰۷
			۱۷	تسليط علمی مشاور	۲۴			نحوه اموزش فردی		زمان ویزیت	۲۰	کفايت تعداد صندلیها در اتاق	۰/۰۷
			۱۷	نحوه برخورد	۲۶			نحوه اموزش فردی		انتظار	۱۹	تسليط علمی مشاور	۰/۰۷
			۲۰	نحوه برخورد	۲۶			نحوه اموزش فردی		نظامت سالن انتظار	۲۰	نحوه برخورد مسئول پذیرش	۰/۰۷
			۲۰	نحوه برخورد	۲۷			نحوه اموزش فردی		در مرکز	۲۰	نور اتاق معاینه و مشاوره	۰/۰۷
			۲۰	نحوه برخورد	۲۷			نحوه اموزش فردی		یادآوری زمان مراجعه	۲۰	نحوه برخورد نگهبانی	۰/۰۷
			۲۰	نظام حضور پرسنل	۲۸			نحوه اموزش فردی		بعدی	۲۰	نظام حضور پرسنل	۰/۰۷
			۲۰	مشاوره تلفنی	۲۸			نحوه اموزش فردی		پوشش پرسنل	۲۰	مشاوره تلفنی	۰/۰۷
			۲۰	علام راهنمایی معرفی به مرکز	۲۸			نحوه اموزش فردی			۲۰	علام راهنمایی معرفی به مرکز	۰/۰۷
			۲۰	نحوه پاسخگویی به سوالات	۲۸			نحوه اموزش فردی			۲۰	نحوه پاسخگویی به سوالات	۰/۰۷
			۲۰	آموزش گروهی	۲۸			آموزش گروهی			۲۰	آموزش گروهی	۰/۰۷

References

- Ahmadizad, A., 2006. Nikan Institute of health research. Classification of information and services of reproductive health for the Youth. Ordered by the office of Youth and schools' health . Deputy of health ,Ministry of health and medical education.
- Braeken, D., Otoo-Oyortey, N. and Serour, G., 2007. International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO). Acces to Sexual and reproductive health Care: Adolescents and young people. International Journal of Gynecology and Obstetrics . Aug, **98**(2), pp.172-174.
- Jaruseviciene, L., Levasseur, G. and Liljestrand, J., 2006. Confidentiality for Adolescence Seeking Reproductive Health Care in Lithuania: The Perception of General Practitioners. Reprod Health Matters. May, **14**(27), pp.129-37.
- Haller, D.M., Sanci, L.A., Patton, G.C. and Sawyer, S.M., 2007. Toward Youth Friendly Services: a Survey of Young People in Primary Care. Gen. Intern Med. Jun, **22**(6), pp.775-81.
- Halevy, A., Hardoff, D., Knishkowy, B. and Palti, H., 1995. A school -linked Health Service for Adolescents in Jersalem. J Sch Health. Dec, **65**(10), pp.416-99.
- Kohan, S., 2003. Patients satisfaction from nursing VS: medical care. Kerman Journal of nursing and midwifery. **3**(10), pp.43-9.
- Papanicolas, I., Smith, P.C. and Mossialos, E., 2008. Principles of performance measurement. The Health Policy Bulletin of the European Observatory on Health Systems and Policies. Spring, **10**(1), pp.1-12.
- Sovd, T., Mmari, K., Lipovsek, V. and Manaseki-Holland, S., 2006. Acceptability as a key determinant of Client Satisfaction :lessons from an Evaluation of -Adolescent Friendly Health Services in Mongolia .J Adolesc Health. May, **38**(5), pp.519-26.
- Lindberg, C., Lewis-Spruill, C. and Crownover, R., 2006. Barriers to sexual and Reproductive Health Care: Urban Male Adolescents speak out .Issues Compr Peiatr Nurs. Apr-Jun, **29**(2), pp.73-88.
- Tylee, A., Haller, D.M., Graham, T., Churchill, R. and Sanci, L.A., 2007. Youth – Friendly Primary –Care Services: how are We doing and what more needs to be done?. Lancet. May 5,**369**(9572), pp.1565-73.
- Zimmer-Gembeck, M.J., Alexander, T. and Nystrom, R.J., 1997. Adolescents Report Their need for and Use of Health Care Services. J Adolesc Health. Dec, **21**(6), pp.388-99.
- Wilf-Miron, R., Sikron, F., Glasser, S. and Barell, V., 2002. Community –Based Adolescent Health Services in Israel: From Theory to Practice. Int J Adolesc Med Health. Apr-Jun, **14**(2), pp.139-44.
- Zeanah, P.D., Morse, E.V., Simon, P.M., Stock, M., Pratt, J.L. and Sterne, S., 1996. Community Reactions to Reproductive Health Care at Three School-Based Clinic in Louisiana. J Sch Health. Sep, **66**(7), pp.237-41.